Strophyliatico

Vass4R06s406-410



Collection Vassal-Montpellier

domindented administration

XII- 15 A6 Strophyliatico









dontoolootoolootoolootool

Strophyliatico ONOR XII PLANCED 15 RANG A Souche 6 Vigueur + 3 PONT : 6016 - (dri): - coaché Milleranices . Coulou Date de Véraison : 10-8-76 Date de Esturité à 6 9 76 CHAPPE : 0 - 6 - P : 0 - 0 - 0 BATT : 13 - 6 - 11 - 9 81926 dise. - Suh. - (011) - ov. obov. - cyl. - fus. COULDING: (B1) - Gr - Hs - Ag - H HATTOUR : (8) - n - ar - for - Lemb. CHARGE : ovec pépins - ppyròne 135 : (no.) - coloré

DESIGNATION: Strophyliatico 231807 CLOS XII PLANCHE 15 RANG A Souche Grice Vigueur : 4 PORT : (érig - 1 érig - couché Millerandage : 4 Date de Véraison: 16.8 24,9,84 Date de Maturité : Pourriture: 0 12 to (could be) GRAPPE : G - N - P : L - H - C BAIE : TG - G - M - P 13x18 disc. - Sph. - (ell'ay ov. obov. - cyl. - fus. COULUUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - H SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 avec pépins - apyrène s21 830 JUS inc. - coloré 340

Strophyliatico great DUSIGNATION : CLOS THE PLANCHE A 5 RANG A Souche & Vigueur : 5 PORT : (erig) - (2 érig) - couché Hillerandage : 1 Date de Véraison: 16-8 Date de Naturité : 19.9.83 Pourriture : 0 GRAPPE : G - H - D ! D - H - C BAIE : TG - G - M - P 19/18 disc. - Sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 avec pépins - apyrène s4 4. Jus inc - coloré,

Année: 1974
Emplacement IS. A. 6.... Désignation Atrophy liatico

! ! Nombre ! Total	DATES					
d'yeux	203	27,3	!	!	!	!!!!!
1 1 1 !			!!	!	1	!!!!
2 6!	-1		!!	!!	!!	!!!
3/			!	!!		1 1
4 3	1	2	1 %	0 6 27	3-17hr	+++
===5 6=================================			!	!		1 1 1 1

Année: 1976
Emplacement ... XII. 15. A6..... Désignation / Stroyhyliatico

!!!		! Nombre ! ! Total !			DATES !			
!	! d'yeux! !		29.3	2-4	17-4	<u> </u>	<u>!</u>	i
1	1	!			!	!!!	!	1
!	2) provens			!		!	
1	3	:}					!	
	4	8	1	3	! 4 ~		!	!
! !	×	!g !	!		!		!	
			D le 7.	4.76	+2	2	THE STATE ST	=====

Année: 1977
Emplacement ... XII 15 A6 ... Désignation Strophy lianco

! Nombre ! Total	DATES!					
! ! d'yeux	7-3	1	!	!	!!!!!	
1) 4 3 ! 4 4) !	3	0 46-13-77	0	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! ! ! ! ! ! ! ! !	

Année: 1978
Emplacement XII 15 A6 ... Désignation Strophyliatico

!	! Nombre ! Total	DATES !				
1	d'yeux	6-3	! 9-3	!	!	1 !
1 1	! 2	0	11.		:	!!!!!!
! 2	! 2	0	2.	!	į	
! 3	4	1.	13.	!	i	
! 4	2	1.	1.	!	i	1-3
; 5	2	0	11	i	i ple	18.3-7.8

Désignation : Emplacement : Strophyliatico

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Strophyliatica
XII 15 A6 A13

Désignation :

Emplacement:

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -45 duveteux 8 - cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 46 - Limbe

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- totalement 1 sillon 2 partiellement 3. 48 -

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

- glabro 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.
 - (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

Calup72

Strophyliatico
XII 15A6 2-4

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8,

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus

Désignation:
Emplacement: XII 15A64.4

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - potite 1 - moyenne 2 - grande Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -34 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. 36 -Surface: unio 1 - onduléo 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5) plissée au point pétiolaire 6: Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long (1) moyon 2 court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvoty

Emplacement:

Désignation:

All 15 A6 (Argèle R42 Est-3-61.65)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache (4) - Moyenne 5 - Compacte 6:

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté agoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

19α(7)
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore () coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. due pépins (8)

31 - A pédicelle long (1) - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2,

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

33 - Do séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 78

```
DEMONINATION: XIL 15 A 60-4 Atrophyliatico
                                         SARMEUT DE VIGHE
                             : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2), myen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2)
 Ecorce
 Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3)
                               autre (4).
                             unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
 Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
 Nocuds
 Mérithalle de longueur moyenne : ..... . . . . . . . . cms .
                              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                               : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocude (4)
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6).
                               violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis 3, souvent : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo 74

Emplacement: XII 15 A 6 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. 9 - L₁/L 1 - 2 - 3. 10 - L₂/L ① - 2. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme 1)- 2 -3 17 - Dents : Méd/B 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2)- 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction Forme . : 4 - (5) Médiane/Base : 6 - 7 - 8,

Nº d'ordre : 2318 04

Origine :

Désignation: Strojhyliatico